

Gentile Signora/e,

La informiamo che occorre effettuare la seguente preparazione per rendere esplorabile il colon.

**PREPARAZIONE INTESTINALE**

- A) Nei tre giorni precedenti** l'esame osservare una dieta rigorosamente **priva di scorie** (eliminare frutta, verdura, crusca ed alimenti integrali in genere) e assumere, **solo per i pazienti con stipsi**, più di 1½ litro di liquidi/die e lassativi (es. Movicol concentrato, 1-2 misurini/die).
- B) Il giorno precedente** l'esame assumere nel corso dell'intera giornata almeno 1 litro di liquidi chiari-trasparenti (liquidi attraverso cui è possibile vedere: acqua, tè, camomilla, tisane, con zucchero o miele, bevande analcoliche, caffè senza panna o latte, succhi di frutta senza polpa, brodo di carne) e assumere, aspettando due ore dopo l'ultimo sorso di liquidi, la seguente preparazione intestinale in funzione dei tempi di esecuzione dell'esame:



**ESAME AL MATTINO**

**1 litro** di soluzione di MOVIPREP **tra le 18.00 e le 19.00**

**1 litro** di soluzione di MOVIPREP **tra le 21.00 e le 22.00**

**poi 1 litro di liquido chiaro** (acqua, tè, camomilla, tisane con zucchero o miele).

Il giorno dell'esame: occorre il **digiuno assoluto dalla mezzanotte** (non bere né mangiare).



**ESAME AL POMERIGGIO**

(dopo le 11.30)

**1 litro** di soluzione di MOVIPREP **tra le 19.00 e le 20.00**

**più ½ litro di liquido chiaro**

**PAUSA NOTTURNA**

**1 litro** di soluzione di MOVIPREP **tra le 7.00 e le 8.00**

**più ½ litro di liquido chiaro** (acqua, tè, camomilla, tisane con zucchero o miele).

Il giorno dell'esame: **non si deve pranzare**. Sono concessi, solo in mattinata, la colazione con tè (**vietati biscotti o altri solidi**) e l'assunzione di liquidi chiari (acqua, tè, camomilla, tisane con zucchero o miele) purché seguiti dal **digiuno assoluto nelle 6 ore precedenti l'esame** (non bere né mangiare).

**TERAPIE FARMACOLOGICHE**

Sono consentite le terapie farmacologiche in compresse e capsule, ma non sciroppi o preparati in busta. E' invece vietato l'uso di altri lassativi (specie lattulosio o similari).

Se soffre di allergie a farmaci o se ha in corso una terapia, occorre informare il medico esaminatore; i farmaci da Lei utilizzati devono essere assunti comunque anche il giorno dell'esame.

Se fosse portatore di protesi valvolari cardiache, pregressa endocardite batterica o malattia cardiaca congenita deve effettuare una profilassi antibiotica.

Se assumesse farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici o soffre di piastrinopenia (PLT <50.000 U/L) richiedi il foglio specifico "Raccomandazioni per le procedure endoscopiche in pazienti in trattamento anticoagulante o antiaggregante o con marcata piastrinopenia" (Allegato n°1 S 21).

**AVVERTENZE**

L'esecuzione degli esami endoscopici comporta **incompatibilità con la guida di automezzi** per effetto della premedicazione con sedativi. Il Medico si riserva di non effettuare la sedo-analgesia cosciente qualora l'utente dichiarasse l'intenzione di mettersi alla guida.

Utile portare gli esiti di eventuali controlli endoscopici e/o radiologici precedenti.

Compilazione	Verifica	Approvazione
Medico Specialista Dott. Alberto Mariani	Assicurazione Qualità Ghezzi Marinella	Direzione Sanitaria Dott. Gabriele Pellicciotta