

*Gentile Signore,*

*La informiamo che per eseguire questo esame è importante attenersi alle istruzioni qui riportate.*

**ISTRUZIONI DA SEGUIRE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'ESAME:**

- sospendere almeno sette giorni prima e sette giorni dopo l'esame, eventuale terapia antiaggregante (ad esempio: Aspirinetta, Tiklid etc.);
- eseguire una settimana prima della prestazione i seguenti esami ematochimici: Emocromo, PT, PTT, PSA (totale e libero);
- in caso di terapia anticoagulante (ad esempio Coumadin, Sintrom) contattare l'urologo che eseguirà l'esame;
- eseguire un clistere (es. Clisma Lax) la sera prima dell'esame e la mattina stessa;
- iniziare la profilassi antibiotica con Levoxacin 500 mg. 1 compressa al giorno alle ore 08.00 cominciando due giorni prima dell'esame per un totale di sette giorni (**si raccomanda di non dimenticare di assumere l'antibiotico il giorno dell'esame**).

**ISTRUZIONI DA SEGUIRE AL MOMENTO DELL'ESAME:**

- non è necessario presentarsi all'esame a digiuno;
- informare i sanitari di eventuali allergie a farmaci e di eventuali terapie in corso;
- allegare i referti degli esami ematochimici eseguiti: Emocromo, PT, PTT, PSA (totale e libero);
- allegare documentazione urologica (ad esempio precedenti di ecografie o biopsie, lettere di dimissioni di precedenti ricoveri etc).

**ISTRUZIONI DA SEGUIRE DOPO AVER ESEGUITO L'ESAME:**

- rimanere in osservazione in sala d'aspetto per almeno 30 minuti;
- rimanere a riposo a casa per almeno 24 ore;
- non effettuare viaggi troppo lunghi in automobile (superiori alle due ore), non andare in bicicletta, moto o a cavallo e non avere rapporti sessuali per almeno sette giorni;
- non preoccuparsi se comparissero delle gocce di sangue nelle urine durante la minzione, o nelle feci o nello sperma: tale sanguinamento, di lieve entità, può perdurare per alcuni giorni;
- in caso di impossibilità alla minzione, di febbre superiore ai 38° C o di **importante sanguinamento**, contattare il Pronto Soccorso più vicino alla propria abitazione.

NB. Se programmata con Cistoscopia la biopsia prostatica deve essere eseguita necessariamente successivamente alla cistoscopia

Compilazione	Verifica	Approvazione
Medico / Direzione Sanitaria Dr. Vincenzo Scattoni / Dr. Gabriele Pellicciotta	Assicurazione Qualità Marinella Ghezzi	Direzione Sanitaria Dr. Gabriele Pellicciotta