

*Gentile Signora/e,*

*La informiamo che per eseguire questo esame è importante attenersi alle istruzioni qui riportate.*

E' necessario togliere le lenti a contatto 24 ore prima dell'esame.

Se sta seguendo una terapia per l'ipertensione oculare o per il glaucoma, si raccomanda di mettere i colliri anche il giorno stesso dell'esame (salvo indicazioni diverse da parte del Medico Oculista).

Impegno richiesto per l'effettuazione dell'esame:

La valutazione dell'andamento pressorio dell'occhio si ottiene attraverso tre misurazioni rilevate in tre momenti diversi della giornata, a distanza di due o tre ore una dall'altra.

L'instillazione di colliri non comporta nessuna riduzione temporanea della capacità visiva. Tra una misurazione e l'altra della pressione oculare i pazienti possono guidare autoveicoli, svolgere attività lavorativa e/o di lettura con l'adeguata correzione su occhiale, dal momento che non possono essere indossate lenti a contatto.

L'utilizzo di lenti a contatto deve essere sospeso per almeno 3 o 4 ore.

Compilazione	Verifica	Approvazione
Medico Dott. Massimo Ferrari	Assicurazione Qualità Dott.ssa Marinella Ghezzi	Direzione Sanitaria Dott. Gabriele Pellicciotta