

*Gentile Signora/e,*

*La informiamo che per eseguire questo test è importante attenersi alle istruzioni qui riportate.*

La metodica del Prick test rientra tra le pratiche di diagnosi delle malattie allergiche Ig-E mediate e, pertanto, sarà eseguita solo nell'ambito della visita specialistica.

Salvo diversa indicazione da parte dello Specialista in funzione dell'anamnesi, il test potrà essere eseguito solo a paziente che abbia sospeso da almeno 1 settimana la terapia farmacologica con antistaminici o cortisonici ad elevato dosaggio per via orale o per via iniettiva. Non abbandonare la terapia antiasmatica in corso (spray anche a base di cortisone) per evitarne la discontinuità.

In caso di dubbi o incertezze o presenza di sintomi rilevanti, è giustificato prendere contatti con lo Specialista, al fine di programmare le modalità di esecuzione del test.

Ricordare di portare con sé la documentazione sanitaria già acquisita ed eventuali esami quali Rast e/o Prist.

<b>Compilazione</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approvazione</b>
Medico Specialista Dott. P.Berardinelli-Dott.R.Donghi- Dott.ssa C.Suli	Assicurazione Qualità Marinella Ghezzi	Direzione Sanitaria Dott. Gabriele Pellicciotta